

## Original Amtsarztfragen der Gesundheitsämter für Heilpraktiker der Psychotherapie mit Lösungen, mit Kommentare

### HPP Amtsarztfragen 2011 Frühjahr

Testen Sie, ob Sie „prüfungsfähig“ sind!

Eine Prüfung wird als bestanden gewertet, wenn mindestens 75 % der Fragen richtig beantwortet wurden; bei 28 Fragen sind das demnach mindestens 21 richtige Antworten. Wenn Sie Ihre Prüfungsfähigkeit einschätzen möchten, sollten Sie allerdings bei Tests, die Sie zum ersten Mal durchführen, eine Quote von etwa 80 % erreichen, denn bei der Amtsarztprüfung kommt erfahrungsgemäß noch der eine oder Fehler durch Aufregung hinzu.

Seien Sie ehrlich zu sich! Schaffen Sie sich selbst prüfungsfähige Bedingungen, indem Sie die vorgegebene Zeit von maximal zwei Minuten pro Frage (bei 28 Fragen also 56 Min) einhalten! Benutzen Sie zum Lösen der Fragen keinerlei Hilfsmittel! Denn diese stehen Ihnen in der Prüfung auch nicht zur Verfügung.

Als Schüler unserer Schule können Sie in unserem E-Learning-System mit den Amtsarztfragen simulierte Prüfungen durchführen und sich das Ergebnis durch Autokorrektur überprüfen lassen.

Die Prüfungsfragen sind außerdem in die Kategorien F0 bis F9, Gesetz, Fachbegriffe, Medikamente, Psychotherapieverfahren und Suizid eingeteilt, sodass Sie die Fragen auch nach bestimmten Kategorien sortiert bearbeiten können und so sehen, ob Sie in bestimmten Teilbereichen „prüfungsfähig“ sind.

Möchten Sie einmal bei der HPP-Ausbildung oder HPP-Prüfungskurs Probieren?

Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten:

1. Schicken Sie uns eine kurze Mail mit Ihrem Wunschtermin, an dem Sie live dabei sein möchten. Die Termine finden Sie hier: <https://www.isolde-richter.de/onlineausbildung-heilpraktiker-psychotherapie/>
2. Schauen Sie sich kostenlos und unverbindlich einen Mitschnitt einer bereits abgelaufenen Schulung an (bitte nach unten zu der alphabetischen Auflistung scrollen): <https://www.elearning-richter.de/>

Gutes Gelingen für Ihre Prüfung wünscht  
Isolde Richter

Typ: Einfachauswahl

Kategorie: F 4

ID: 115

1) Welche Aussage trifft zu?  
Dissoziative Störungen (nach ICD10)

- a) sind Störungen mit objektivierbaren Symptomen der vegetativen Simulation wie Herzklopfen, Schwitzen, Erröten, Zittern
- b) sind Störungen mit Schmerz und anderen komplexen Empfindungen, die durch das vegetative Nervensystem vermittelt werden
- c) sind Störungen der normalen Integration von Erinnerungen an die Vergangenheit, des Identitätsbewusstseins, der unmittelbaren Empfindungen sowie der Kontrolle von Körperbewegungen
- d) werden vom Patienten als abnorm und belastend interpretiert; die Aufmerksamkeit wird meist auf ein oder zwei Organe oder Organsysteme fokussiert
- e) sind Störungen, die trotz anders lautender ärztlicher Befunde mit der anhaltenden Überzeugung und ständigen Sorge darum einhergehen, an einer schweren körperlichen Erkrankung zu leiden

richtige Antwort(en): c

Typ: Einfachauswahl

Kategorie: F 2

ID: 116

2) In welchem Alter erwarten Sie am ehesten die Erstmanifestation produktivpsychotischer Symptome bei einem männlichen Patienten mit Schizophrenie?  
Im Alter von etwa

- a) 9 Jahren
- b) 61 Jahren
- c) 43 Jahren
- d) 55 Jahren
- e) 22 Jahren

richtige Antwort(en): e

Typ: Aussagenkombination

Kategorie: F 2

ID: 117

3) Welcher der folgenden Aussagen zum Störungsbild der Schizophrenie treffen zu?

- 1) Die Symptomatik muss seit mindestens 3 Monaten bestehen
  - 2) Gedankenentzug gehört zu den Ich-Störungen
  - 3) Gedankenabreißen gehört zu den Ich-Störungen
  - 4) Akustische Halluzinationen können die Form imperativer Stimmen annehmen
  - 5) Die katatone Schizophrenie ist die häufigste Unterform der Schizophrenie
- 
- a) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
  - e) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig

richtige Antwort(en): b

Typ: Aussagenkombination

Kategorie: Suizid

ID: 118

4) Welche der folgenden Aussagen zur Suizidalität treffen zu?

- 1) Der Suizid rangiert in den meisten europäischen Ländern und in den USA unter den zehn häufigsten Todesursachen
  - 2) Bei Männern ist die Suizidrate deutlich höher als bei Frauen
  - 3) Es ist bekannt, dass viele Betroffene innerhalb des letzten Monats vor dem vollzogenen Suizid einen Arzt aufgesucht hat
  - 4) Bei Verdacht auf Suizidalität sollte man nicht nach sozialen Kontakten fragen
  - 5) Das präsuizidale Syndrom nach Ringel wird mit folgender Trias beschrieben: Einengung, Suizidfantasien und Aggressionsumkehr
- 
- a) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig
  - e) Alle Aussagen sind richtig

richtige Antwort(en): c

Typ: Mehrfachauswahl

Kategorie: F 1

ID: 119

5) Welche der folgenden Aussagen zur Alkoholerkrankung treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Etwa 1% aller männlichen Patienten in psychiatrischen Krankenhäusern sind alkoholabhängig.
- b) Bei erwachsenen Frauen gilt ein dauernder Alkoholkonsum erst über 60 g pro Tag als schädlich.
- c) Wenn ein Elternteil Alkoholiker ist, ist die Wahrscheinlichkeit an Alkoholismus zu erkranken um das Mehrfache gesteigert.
- d) Männer sind häufiger betroffen als Frauen.
- e) Die Einteilung der Alkoholkranken nach Jellinek bezieht sich auf das Verhalten des Betroffenen bei Alkoholentzug.

richtige Antwort(en): c d

Typ: Einfachauswahl

Kategorie: F 4

ID: 120

- 6) Eine 40-jährige Verkäuferin stellt sich in Ihrer Praxis vor. Sie habe vor 4 Monaten einen Autounfall erlitten. Dabei sei Ihr Ehemann tödlich verletzt worden. Er sei noch an der Unfallstelle verstorben. Sie selbst habe nur mit leichten Verletzungen überlebt, musste aber mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Unfallwagen befreit werden. Nun klagt sie über sich immer wieder aufdrängende, szenisch ablaufende Erinnerungen. Sie könne kaum noch schlafen, fühle sich verängstigt und freudlos. Welche Diagnose beschreibt das Zustandsbild am besten?

- a) Zwangsstörung
- b) Organische Persönlichkeitsstörung
- c) Posttraumatische Belastungsstörung
- d) Dysthymia
- e) Akute Belastungsreaktion

richtige Antwort(en): c

Typ: Aussagenkombination

Kategorie: Psychotherapieverfahren

ID: 121

7) Welche der folgenden Aussagen hinsichtlich der alterstypischen Akzentuierung psychischer Störungen und der psychotherapeutischen Behandlung älterer Menschen treffen zu?

- 1) Die hohe Multimorbidität älterer Menschen ist ein erschwerender Faktor für die Psychotherapie
  - 2) Die häufigsten psychischen Störungen bei über 65-Jährigen sind die demenziellen und depressiven Syndrome
  - 3) Das Suizidrisiko nimmt im Alter ab
  - 4) Depressionen im Alter gehen oft mit somatischen Beschwerden einher
  - 5) Die Gesamtprävalenz psychischer Störungen nimmt im Alter ab
- 
- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 1, 2, und 4 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
  - e) Alle Aussagen sind richtig

richtige Antwort(en): c



Typ: Aussagenkombination

Kategorie: Psychotherapieverfahren

ID: 122

8) Welche der folgenden Begriffe gehören zur Therapieform Psychoanalyse?

- 1) Abwehr
  - 2) Widerstand
  - 3) Gegenübertragung
  - 4) Reizkonfrontation
  - 5) Abstinenz des Therapeuten
- 
- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig
  - e) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig

richtige Antwort(en): d

Typ: Einfachauswahl

Kategorie: F 0

ID: 123

9) Welcher Zustand ist durch den Begriff „Delir“ bezeichnet?

- a) Chronische organische Psychose
- b) Chronische organische Persönlichkeitsveränderung
- c) Chronische irreversible Psychose
- d) Akute reversible Psychose
- e) Akute irreversible Psychose

richtige Antwort(en): d

Typ: Mehrfachauswahl

Kategorie: F 0

ID: 124

10) Welche der folgenden Aussagen zur Diagnostik von Demenzerkrankungen treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Die Verminderung der Affektkontrolle und des Antriebs oder eine Änderung des Sozialverhaltens muss sich in allen folgenden Merkmalen manifestieren: Emotionale Labilität, Reizbarkeit, Apathie und Vergröberung des Sozialverhaltens
- b) Ein Kriterium ist die Verminderung der Urteilsfähigkeit und das Denkvermögens, z.B. die Fähigkeit zu planen
- c) Die kognitiven Beeinträchtigungen halten typischerweise 2-3 Monate an
- d) Ein Kriterium ist die Abnahme des Gedächtnisses, die am deutlichsten beim Lernen neuer Informationen auffällt
- e) Ein akuter Verwirrheitszustand ist ein typisches Frühsymptom einer Demenz

richtige Antwort(en): b d

Typ: Mehrfachauswahl

Kategorie: F 8

ID: 125

11) Welche der folgenden Aussagen treffen auf das Asperger-Syndrom zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Es sind überwiegend Mädchen betroffen
- b) Typisch ist eine deutlich verminderte Sprachfähigkeit
- c) Die Teilnahme am Unterricht einer Regelschule ist generell nicht möglich
- d) Es besteht ein geringes Interesse an sozialen Kontakten
- e) Die meisten Patienten besitzen eine normale allgemeine Intelligenz

richtige Antwort(en): d e

Typ: Einfachauswahl

Kategorie: F 2

ID: 126

12) Welcher Begriff beschreibt das gemeinsame Auftreten von wahnhaften Störungen gleichen Inhaltes bei zwei Personen mit enger emotionaler Bindung, wobei nur einer an einer echten psychotischen Störung leidet und die Wahnvorstellungen bei einer anderen Person induziert sind und bei einer Trennung wieder verschwinden kann?

- a) Kombinierte psychotische Störung
- b) Münchhausen by proxy-Syndrom (Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom)
- c) Asperger-Syndrom
- d) Folie a deux
- e) Beziehungswahn

richtige Antwort(en): d

Typ: Mehrfachauswahl

Kategorie: Gesetz

ID: 127

13) Welche der folgenden Aussagen zur Durchführung von freiheitsentziehenden Maßnahmen treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Die öffentlich-rechtliche Unterbringung wird durch Gesetze der einzelnen Bundesländer geregelt
- b) Der Heilpraktiker (mit einer auf das Gebiet der Psychotherapie beschränkten Erlaubnis) muss bei akuter Fremd- oder Selbstgefährdung des Patienten ein Zeugnis zur Unterbringung anfertigen
- c) Das Betreuungsrecht gilt als eine weitere Möglichkeit, eine Person unter gewissen Voraussetzungen gegen ihren Willen einzuweisen
- d) Die Information von Angehörigen wird den Betroffenen bei zwangsweisen Unterbringungen grundsätzlich nicht gestattet
- e) Bei polizeilicher Zwangseinweisung ist eine Unterbringung ohne richterliche Überprüfung für die Dauer von 6 Wochen möglich

richtige Antwort(en): a c

Typ: Aussagenkombination

Kategorie: F 2

ID: 128

14) Die 46 Jährige Bewohnerin einer sozialen Wohngruppe greift einen Mitbewohner mit ihrem Taschenmesser an und fügt ihm schwere Verletzungen zu. Anschließend berichtet sie, aus Notwehr gehandelt zu haben, da der Mitbewohner sie und ihre Familie seit vielen Jahren schädige. Er stehe mit dem Satan im Bunde und habe über Jahre hinweg ihre Gedanken mitgehört. Dass er gerade sie als Opfer ausgewählt habe, hänge damit zusammen, dass sie die Mutter von Jesus sei. In einem anderen Leben sei sie Nofretete gewesen. Welche folgenden Symptome liegen vor?

- 1) Depersonalisation
- 2) Größenwahn
- 3) Halluzinationen
- 4) Verfolgungswahn
- 5) Gedankenausbreitung

- a) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- b) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- c) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- d) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
- e) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig

richtige Antwort(en): d

Typ: Einfachauswahl

Kategorie: F 1

ID: 129

- 15) Ein Patient, der gerne auf Volksfesten Bier trinkt, bittet Sie um eine Beratung zur Alkoholmenge. Welche Aussage zur Alkoholmenge in Gramm von Bier trifft zu?

1Maß (1Liter) Bier mit einem normalen Alkoholgehalt (von ca. 5 Vol%) enthält etwa

- a) 4 g Alkohol
- b) 10 g Alkohol
- c) 40 g Alkohol
- d) 100 g Alkohol
- e) 400 g Alkohol

richtige Antwort(en): c



Typ: Einfachauswahl

Kategorie: F 3

ID: 130

16) Welche formale Denkstörung tritt bei der Manie am häufigsten auf?

- a) Illusion
- b) Größenwahn
- c) Ideenflucht
- d) Grübelzwang
- e) Perseveration

richtige Antwort(en): c

Typ: Einfachauswahl

Kategorie: F 4

ID: 131

17) Welche Aussage zur sozialen Phobie trifft zu?

- a) Es besteht die Furcht vor einem Aufenthalt in geschlossenen Räumen
- b) Sie entspricht einer Agoraphobie
- c) Das Hauptmerkmal dieser Störung ist ein Verhalten, das den geltenden sozialen Normen krass widerspricht
- d) Es besteht die Furcht, in einer Gruppe von Menschen im Mittelpunkt zu stehen und deren prüfenden Blicken ausgesetzt zu sein
- e) Das Leitsymptom ist eine allgemeine, persistierende Ängstlichkeit

richtige Antwort(en): d

Typ: Einfachauswahl

Kategorie: F 2

ID: 132

18) Welche Beschreibung trifft auf die katatone Form der Schizophrenie zu?

- a) Affektstörung mit heiter-läppischer Grundstimmung steht im Vordergrund
- b) Vorherrschend sind Wahn und Halluzinationen
- c) Psychomotorische Störungen stehen in Vordergrund
- d) Vorherrschend sind Gedankenentzug und Gedankenausbreitung
- e) Vorherrschend sind Zerfahrenheit, Gedankenabreißen und Neologismen

richtige Antwort(en): c

Typ: Mehrfachauswahl

Kategorie: Psychotherapieverfahren

ID: 133

19) Welche der folgenden Aussagen zu dem Begriff „Gegenübertragung“ treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Der Patient verhält sich im längeren Verlauf einer Psychotherapie dem Therapeuten gegenüber so, wie er es früher in Beziehungen zu anderen bedeutsamen Personen getan hat
- b) Die Gefühle, die beim Therapeuten durch den Klienten ausgelöst werden, bezeichnet man als Gegenübertragung
- c) Die Gegenübertragung ist in der klassischen Psychoanalyse von großem Wert
- d) Eine Selbstanalyse des Therapeuten spielt in diesem Zusammenhang keine wichtige Rolle
- e) Die Deutung der Gegenübertragungsphänomene ist kein essentieller Teil der tiefenpsychologisch orientierten Psychotherapie

richtige Antwort(en): b c

Typ: Mehrfachauswahl

Kategorie: F 4

ID: 134

20) Welche der folgenden Aussagen treffen für eine Somatisierungsstörung zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Eine Somatisierungsstörung ist als spezifische Form der depressiven Störung definiert
- b) Es kommen nur neurologische Beschwerden vor
- c) Die Körpersymptome müssen nach den diagnostischen Leitlinien mindestens 2 Jahre bestehen
- d) Die Körpersymptome müssen nach diagnostischen Leitlinien mindestens 6 Monate bestehen
- e) Es findet sich keine ausreichende somatische Erklärung für die Symptome

richtige Antwort(en): c e

Typ: Aussagenkombination

Kategorie: F 1

ID: 135

21) Welche der folgenden Aussagen über die Wernicke-Enzephalopathie treffen zu?

- 1) Ursache ist ein Thiaminmangel (Vitamin B1), der z.B. durch langjährigen Alkoholkonsum ausgelöst werden kann
- 2) Die Wernicke-Enzephalopathie kann tödlich verlaufen
- 3) Ein wichtiges Frühsymptom sind Konfabulationen
- 4) Die Wernicke-Enzephalopathie geht mit Augenmuskellähmungen, Ataxie und organischem Psychosyndrom einher
- 5) Bei der Wernicke-Enzephalopathie treten typischerweise keine Orientierungsstörungen auf

- a) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
- b) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- c) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- d) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
- e) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig

richtige Antwort(en): c

Typ: Einfachauswahl

Kategorie: Suizid

ID: 136

22) Was versteht man unter einem erweiterten Suizid?

- a) Suizid als Folge eines anderen Suizides im Bekanntenkreis
- b) Ein Suizid wird so verschleiert, dass das Ereignis wie ein Unfall wirkt
- c) Zwei Personen töten sich gegenseitig
- d) Suizid unter beabsichtigter Mitnahme von weiteren Personen (z.B. Kinder) ohne deren Einverständnis
- e) Zwei oder mehrere Personen des Betroffenen beschließen, sich gemeinsam das Leben zu nehmen

richtige Antwort(en): d

Typ: Mehrfachauswahl

Kategorie: F 6

ID: 137

23) Welche der folgenden Aussagen zur Borderline-Persönlichkeitsstörung treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Bei vielen Patienten kommt es zu wiederholten suizidalen Handlungen, Selbstmordandeutungen oder -drohungen
- b) Kennzeichnend ist ein übertriebenes Gefühl der eigenen Wichtigkeit
- c) Dramatische Selbstdarstellung und theatralisches Auftreten sind wesentliche Leitsymptome
- d) Häufig liegt eine ausgeprägte und andauernde Instabilität des Selbstbildes oder der Selbstwahrnehmung vor
- e) Das Leitsymptom der Störung ist ein Verhalten, das den geltenden sozialen Normen krass widerspricht

richtige Antwort(en): a d



Typ: Einfachauswahl

Kategorie: F 9

ID: 138

24) Welche Aussage zur Enuresis nocturna trifft zu?

- a) Sekundäre Enuresis bedeutet: Das Kind war noch nie trocken
- b) Kinder, bei denen nach dem 7. Lebensjahr noch eine Enuresis nocturna vorliegt, werden in erster Linie medikamentös behandelt
- c) In vielen Fällen ist eine Enuresis nocturna lediglich eine Reifungsverzögerung
- d) Klingel- oder Weckgeräte sind bis zum Alter von fünf Jahren einsetzbar
- e) Wichtig ist eine konsequente Flüssigkeitsrestriktion

richtige Antwort(en): c

Typ: Aussagenkombination

Kategorie: Medikamente

ID: 139

25) Welche der folgenden Aussagen zu Tranquilizern/Anxiolytika trifft (treffen) zu?

- 1) Es handelt sich um Medikamente, die emotional entspannende Wirkeigenschaften haben
- 2) Die Gefahr einer Abhängigkeit ist nicht gegeben
- 3) Ältere Patienten können paradox auf Tranquilizer reagieren
- 4) Benzodiazepine weisen keine Toleranzentwicklung auf
- 5) Bei plötzlichem Absetzen können Krampfanfälle auftreten

- a) Nur die Aussage 5 ist richtig
- b) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
- c) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- d) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- e) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig

richtige Antwort(en): c

Typ: Aussagenkombination

Kategorie: Medikamente

ID: 140

26) Welche der folgenden Aussagen zu Neurotransmittern treffen zu?

- 1) Störungen im Neurotransmittersystem wirken entscheidend bei der Entstehung affektiver Erkrankungen mit
  - 2) Wichtige Transmitter heißen Adrenalin, Noradrenalin und Serotonin
  - 3) Synapse nennt man den Bereich, in dem ein Reiz mittels Neurotransmittern von einer Nervenzelle auf eine andere übertragen wird
  - 4) Johanniskraut hat als pflanzliches Medikament keine Wirkung auf das Neurotransmittersystem
  - 5) Ein Überangebot Von Neurotransmittern führt häufig zu vaskulärer Demenz
- 
- a) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig
  - e) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig

richtige Antwort(en): a

Typ: Aussagenkombination

Kategorie: F 7

ID: 141

27) Welche der folgenden Aussagen sind einer leichten Intelligenzminderung (IQ 50-69) zuzuordnen?

- 1) Verzögerte Sprachentwicklung, jedoch meist für die täglichen Anforderungen ausreichend
  - 2) In der Regel besteht eine Inkontinenz.
  - 3) Es besteht die Unfähigkeit, selbst einfache Aufforderungen oder Anweisungen zu verstehen oder auszuüben.
  - 4) Der Besuch einer Förderschule für Lernbehinderte oder geistig Behinderte ist in der Regel möglich.
  - 5) Es besteht meist die Fähigkeit für angeleitete, praktische Tätigkeiten.
- 
- a) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig.
  - b) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
  - c) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.
  - d) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.
  - e) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig.

richtige Antwort(en): d

Typ: Aussagenkombination

Kategorie: F 0

ID: 142

28) Welche der folgenden Erkrankungen können zu einer Demenz führen?

- 1) Arteriosklerose
  - 2) Morbus Parkinson
  - 3) HIV-Krankheit
  - 4) Schilddrüsenüberfunktion
  - 5) Multiple Sklerose
- 
- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig
  - e) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig

richtige Antwort(en): d

